

## **Dott. Massimiliano Molfetta**

medico chirurgo ~ specialista in chirurgia generale  
via Annibale De Lotto 34/a ~ San Vito di Cadore  
amb. 0436890344 ~ cellulare 330537056 ~ [www.molfettamassimiliano.it](http://www.molfettamassimiliano.it)

Dopo un trauma cranico è necessario valutare , nelle ore e nei giorni successivi al trauma , lo stato di coscienza e vigilanza il comportamento , lo stato di equilibrio, la motilità attiva e passiva

E' necessario tenere in considerazione:

- )] riduzione dello stato di vigilanza: ad esempio, ridotta capacità di risposta ai richiami verbali e/o agli ordini verbali
- )] variazioni del comportamento: tendenza a dormire e/o riposare troppo , senso di stanchezza , irritabilità.
- )] riduzione del controllo dell' equilibrio: tendenza a muoversi con poca stabilità e sicurezza; tendenza a cadere con facilità
- )] riduzione della motilità attiva e passiva
- )] comparsa di sensazione di formicolio, parestesie dolorose e non , di sensazione di anestesia, specie agli arti.
- )] comparsa di disturbi di linguaggio.
- )] comparsa di convulsioni con o senza perdita di coscienza.

In presenza anche di uno solo di questi segni è opportuno rivolgersi al 118 o al Pronto Soccorso più vicino

Il vomito e la cefalea sono segni frequenti , specie nelle prime ore dopo il trauma :

- )] se isolati , cioè non associati ad altri segni riferiti, non costituiscono motivo di allarme
- )] se intensi o persistenti o associati ad altri segni o sintomi richiedono controllo medico urgente