

ECO(COLOR)DOPPLER ARTERIOSO

ESAME ARTERIOSO ARTI SUPERIORI	
Cod. 88.77.6 ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO . A riposo. La prestazione sostituisce il cod. 88.77.2. Inclusa la valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi.	
Cod. 88.77.7 ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO . La prestazione sostituisce il cod. 88.77.2. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa la valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi.	
CLASSE DI PRIORITÀ (Ricettario S.S.N.)	"PAROLE CHIAVE" INDICATE DAL GRUPPO DI LAVORO
URGENTE	<p>l'Ischemia acuta (assenza dei polsi arteriosi non nota, pallore dell'arto, ipotermia, parestesie e riduzione della sensibilità) è una condizione patologica per la quale è indicato inviare il paziente in Pronto Soccorso per una valutazione chirurgica urgente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospetta trombosi venosa profonda dell'arto superiore. — Edema dell'intero arto — arrossamento o pallore dell'arto — turgore dei vasi venosi superficiali — dolore
B BREVE (max 10 giorni)	<ul style="list-style-type: none"> • NON PREVISTA
D DIFFERITA (max 30 giorni)	<ul style="list-style-type: none"> • NON PREVISTA
P PROGRAMMATA (max 60/90 giorni)	<ul style="list-style-type: none"> • Acrosindromi vascolari (fenomeno di Raynaud, acrocianosi, eritromelalgia, acrorigiosi, perniosi). • Modificazioni del colorito e/o della temperatura cutanea, solitamente di mani e dita in situazioni di tensione nervosa, ipotermica o ipertermia ambientale. • Sdr dello stretto toracico superiore: <ul style="list-style-type: none"> - tumefazione dell'arto superiore; - congestione venosa; - parestesie in particolare posizionali (es.: posizione prona nel sonno) • - astenia o pallore cutaneo per sforzi con braccio elevato.

CLASSIFICAZIONE ARTERIOPATIA OBLITERANTE PERIFERICA SECONDO LERICHE - FONTANE	
Stadio	Clinica
I	Asintomatico
IIa	Claudicazione > 200 m. (o più di 2 rampe di scale)
IIb	Claudicazione < 200 m. (o meno di 2 rampe di scale)
III*	Dolore a riposo per più di 2 settimane, che necessita regolarmente di analgesici.
IV*	Ulcere o gangrena.

* Ischemia critica arti inferiori (ICAI)