

**ECO(COLOR)DOPPLER AORTA ADDOMINALE**

Cod. 88.76.3 – ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	
Cod. 88.76.4 - ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI SENZA E CON mdc. Escluso vasi viscerali.	
CLASSE DI PRIORITÀ (Ricettario S.S.N.)	CARATTERISTICHE CLINICHE
<b>U</b> URGENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dolore addominale in presenza di aneurisma già noto</li> <li>Dolore addominale in presenza di massa pulsante.</li> </ul> <p>E' più indicato inviare il paziente in Pronto Soccorso per una valutazione chirurgica vascolare urgente.</p>
<b>B</b> BREVE (max 10 giorni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massa addominale pulsante asintomatica.</li> </ul>
<b>D</b> DIFFERITA (max 30 giorni)	- <b>NON PREVISTA</b>
<b>P</b> PROGRAMMATA (max 60/90 giorni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uomini e donne &gt; a 60 anni, con familiarità per aneurisma dell'aorta addominale.</li> <li>Uomini e donne fumatori con età &gt; a 65 anni.</li> <li>Presenza di arteriopatia periferica e/o carotidea e/o coronaropatia.</li> <li>Presenza di aneurisma in altre sedi (aorta toracica, arti inferiori)</li> </ul>

PERIODICITA' CONTROLLI IN PAZIENTI CON ANEURISMA DELL'AORTA ADDOMINALE (AAA)	
Ectasia aorta addominale (diametro aorta 2-2.9 cm) Ectasia sacciforme aorta addominale (diametro < 3 cm)	Annuale Consulenza specialistica
Aneurisma aorta addominale con diametro > 3 cm.	Consulenza specialistica
Aneurisma aorta addominale con diametro > 3 cm in sorveglianza specialistica.	Semestrale *
Aneurisma aorta addominale in flow-up post-intervento:	
• Open	Annuale
• Endovascolare	Dopo un mese dall'intervento (coba T.C.), poi semestrale **

\* In caso di aumento di calibro  $\geq$  a 7 mm in 6 mesi o  $\geq$  a 10 mm in un anno, consulenza specialistica.

\*\* In caso di aumento del calibro della sacca aneurismatica esclusa o di comparsa di endoleak, consulenza specialistica.