

PRIMA VISITA PER OSTEOPOROSI

| CLASSE DI PRIORITÀ<br>(Ricettario S.S.N.)  | “PAROLE CHIAVE” INDICATE DAL GRUPPO DI LAVORO  |
|--|--|
| <b>U</b> URGENTE                           | - NON PREVISTA   |
| <b>B</b> BREVE<br>(max 10 giorni)          | - NON PREVISTA   |
| <b>D</b> DIFFERITA<br>(max 30 giorni)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paziente con pregressa frattura da fragilità (cioè spontanea o da trauma non efficiente)</li> <li>- Paziente con alterazione degli esami di laboratorio riguardanti il metabolismo fosfo-calcico</li> <li>- <b>Esami necessari per l'accesso: emocromo, ves, profilo proteico, creatininemia, fosfatasi alcalina, gammaGT, calcemia, fosforemia, calciuria, fosfaturia, dosaggio vitamina D3, PTH (eseguiti entro i 3 mesi precedenti) e Densitometria ossea ( DXA) eseguita entro i 2 anni precedenti</b></li> </ul> |
| <b>P</b> PROGRAMMATA<br>(max 60/90 giorni) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pazienti che presentino alla densitometria ossea ( DXA) riduzione dei valori di BMD o pazienti con fattori di rischio per osteoporosi e/o per frattura</li> <li>- <b>Esami necessari per l'accesso: emocromo, ves, profilo proteico, creatininemia, fosfatasi alcalina, calcemia, fosforemia, calciuria ) eseguiti entro i 6 mesi precedenti e Densitometria ossea ( DXA) eseguita entro i 2 anni precedenti</b></li> </ul>   |